

Bélangier, vous verrez qu'il est encore plus singulier par les armatures qu'il porte là, que par la forme bombée de son dos.— Nous lui ouvrimes la bouche et reconnûmes de suite des pièces semblables à celles qu'on avait trouvée à Lotbinière. Nous pûmes facilement nous convaincre alors que ce que nous avions pris pour un crâne était tout au contraire l'os pharyngien inférieur du Corb ; et voilà pourquoi nous ne trouvions pas moyen d'ajuster des mâchoires à ce prétendu crâne.

Il est probable que ces grosses dents en velours se reproduisent à mesure qu'elles se perdent, car dans la pièce que nous avons, il y a plusieurs vides et plusieurs dents aussi beaucoup plus courtes que les autres, semblant n'être qu'au commencement de leur croissance.

Nous avons rangé le Corb dans la famille des Labroïdes, bien que Cuvier le place dans une autre famille, dont il est presque le type, celle des Sciénoïdes. Ses opercules avec pointes semblent en effet, le rapprocher des Percoïdes, mais d'un autre côté sa formule ptérygiale l'associe étroitement aux Labroïdes. Attendons que de nouvelles études viennent faire disparaître toute incertitude à ce sujet.

(A Continuer).

LES ICHNEUMONIDES DE QUÉBEC

ADDENDA ET CORRIGENDA.

(Continué de la page 183).

Gen. MESOSTENUS, Vol. VI, p. 300.

5. Mésostène pieds-roux. *Mesostenus rufipes*. nov. sp.

♀ —. Long. .30 pouce. Noir ; le scape, les mandibules, les palpes, les écailles alaires avec un point en avant et une ligne en dessous, les 4 hanches antérieures avec leurs trochantins, blanc. Antennes lon-

gues, filiformes, noires, les 3 premiers articles pâles. Lobes du mésothorax très distincts, le médian proéminent. Écusson et post-écusson tachés de jaune. Métathorax sub-cylindrique, à lignes soulevées peu apparentes. Ailes hyalines, à nervures brunes, aréole petite, en parallélogramme oblique. Pattes rousses, les jambes et les tarsi plus ou moins obscurs. Abdomen allongé, à pédicule assez long, égal dans toute sa longueur, noir avec les sutures entre les segments blanches, de même que l'extrémité. Tarière presque aussi longue que l'abdomen.

Un seul spécimen ♀. Très belle espèce, d'un noir poli et brillant sur le thorax.

6. Mésostène pieds-pâles. *Mesostenus pallipes*. nov. sp.

♀—Long. .21 pouce. Noir; le scape en dessous, les écailles alaires, les hanches avec les 4 pattes antérieures, blanc ou jaune pâle. Antennes filiformes, brunes, pâles à la base. Lobes du mésothorax distincts quoique d'égale hauteur. Écusson noir. Ailes hyalines, à nervures brunes, pâles à la base, aréole petite, presque carrée, stigma grand, noir. Pattes postérieures jaunâtres, leurs jambes avec leurs tarsi plus ou moins bruns. Abdomen à pédicule moyen, noir avec une tache jaunâtre au milieu de chaque segment, ces taches plus larges au sommet qu'à la base et formant dans leur ensemble une bande longitudinale jaunâtre, extrémité blanche ou jaunâtre; tarière à peine de la moitié de la longueur de l'abdomen.

Un seul spécimen ♀. Espèce bien distincte.

7. Mésostène cornes-noires. *Mesostenus nigricornis*. nov. sp.

♂—Long. .30 pouce. Noir; la face au dessous des antennes, les mandibules, les palpes, la première paire de hanches avec les 4 trochantins antérieurs, blanc. Antennes sétacées, plus longues que le corps, noires, le scape taché de blanc en dessous. Écailles alaires blanches. Impressions du mésothorax très distinctes; métathorax à lignes soulevées très apparentes avec une petite pointe en arrière. Ailes hyalines, stigma grand, noir, taché de blanc à la base, nervures brunes, aréole pentagonale, non très petite. Abdomen allongé, étroit, linéaire, entièrement noir. Pattes rousses, les postérieures avec un petit anneau au sommet des cuisses, l'extrémité des jambes, et les tarsi, brun plus ou moins foncé; les 4 hanches postérieures rousses.

Deux spécimens ♂.

8. Mésostène soyeux. *Mesostenus sericeus*. nov. sp.

♂—Long. .25 pouce. Noir avec une courte pubescence blanche soyeuse, très abondante sur la face; le scape en dessous, les mandibules,

les palpes, les écailles alaires avec les 4 hanches antérieures et leurs trochantins, blanc. Antennes longues, filiformes, noires. Thorax poli, brillant en dessus, mésothorax à impressions très distinctes; métathorax sans pointes. Abdomen allongé, linéaire, plus gros vers l'extrémité, entièrement noir, le pédicule long, canaliculé. Ailes hyalines, iridescentes, stigma grand, brun, aréole petite, pentagonale. Pattes rousses, les postérieures avec les trochantins noirs et les jambes et les tarses obscurcis de brun.

Un seul spécimen ♂.

9. **Mésostène annelé.** *Mesostenus annulatus*. nov. sp.

♂—Long. .32 pouce. Noir; la face, les palpes avec un anneau aux jambes, blanc ou jaune pâle. Antennes grenues, sétacées, brunâtres en dessus, roussâtres en dessous, avec anneau blanc au de là du milieu. Orbites roux, élargis en arrière des yeux. Écailles alaires avec une petite ligne en avant et une autre au dessous, jaune-roussâtre; écusson et post-écusson, jaune. Lobes du mésothorax indistincts; métathorax à lignes peu soulevées. Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, stigma roussâtre; aréole petite, pentagonale. Pattes rousses, les postérieures avec le sommet des cuisses et des jambes, la base de ces dernières et leurs tarses, noir; un anneau pâle à toutes les jambes un peu au dessous de la base. Abdomen assez long, à pédicule légèrement élargi en arrière, entièrement roux, l'extrémité un peu obscurcie.

Un seul spécimen ♂. Espèce bien caractérisée.

10. **Mésostène à tarses blancs.** *Mesostenus tarsatus*. nov. sp.

♂—Long. .40 pouce. Noir, abdomen roux; la face, le chaperon, les mandibules, les palpes, le collier en dessus, une ligne sur les bords du prothorax, les écailles alaires avec une petite ligne au dessous, une ligne sur les côtés des l'écusson avec un large anneau aux tarses postérieurs, blanc. Antennes longues, filiformes, noires. Mésothorax à lobes distincts, le médian soulevé; métathorax fortement ponctué ou granuleux, presque sans lignes soulevées. Ailes hyalines, nervures brunes, aréole très petite, carrée. Pattes rousses, les postérieures noires. Les hanches postérieures noires, les 4 antérieures blanches tachées de noir à la base. Abdomen entièrement roux, luisant, allongé, linéaire, le pédicule long, un peu élargi en arrière.

Deux spécimens ♂.

11. **Mésostène hanches-blanches.** *Mesostenus albicoxus*.
nov. sp.

♂—Long. .23 pouce. Noir; la face au dessous des antennes, les joues, le chaperon, les mandibules, les palpes, les écailles alaires, les 4 hanches antérieures avec leurs trochantins, blanc. Antennes plus longues que le corps, sétacées, noires. Métathorax à lignes soulevées très distinctes. Ailes légèrement obscures, stigma brun, aréole petite, pentagonale. Pattes rousses, les postérieures avec l'extrémité des jambes et les tarsi bruns. Abdomen épais à l'extrémité, les segments 2, 3 et 4 et l'extrémité du premier, roux, le reste noir, les segments 2 et 3 rétrécis dans leur partie antérieure.

Un seul spécimen ♂. La forme des segments 2 et 3 de l'abdomen est particulièrement remarquable, ces segments portant comme un pli transversal vers leur milieu et étant diminués dans leur partie antérieure.

12. **Mésostène thoracique.** *Mesostenus thoracicus*, Cress.

Mesostenus thoracicus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 314,
♂ ♀.

Quatre spécimens ♀ de cette magnifique espèce, dont l'un pris à St. Hyacinthe.

13. **Mésostène hanches-rousses.** *Mesostenus ruficoxus*.
nov. sp.

♂—Long. .31 pouce. Roux; tête noire avec la face, le chaperon, les mandibules et les palpes, blanc. Antennes sétacées, un peu plus longues que le corps, avec un anneau jaune au de là du milieu, le scape taché de roux en dessous. Écusson et post-écusson blancs, avec une ligne noire dans la suture du métathorax. Ailes légèrement obscures, à nervures brunes, stigma roussâtre, aréole assez grande, presque carrée. Abdomen s'allongeant en massue, roux avec l'extrémité noire, le dernier segment taché de jaune. Pattes rousses, les postérieures avec les tarsi blancs.

Deux spécimens ♂, voisin du *fulvus*, Cress. mais en différant par l'absence de marques blanches au thorax.

14. **Mésostène apical.** *Mesostenus apicalis*. nov. sp.

♂—Long. .22 pouce. Noir; le chaperon, une ligne courte en dedans des yeux, les palpes, les écailles alaires, une petite ligne au dessous, l'écusson et le post-écusson avec les deux derniers segments de l'abdomen, d'un beau blanc. Antennes plus longues que le corps, sé-

tacées, grenues, d'un noir roussâtre avec un anneau blanc au delà du milieu. Métathorax avec une courte pubescence grisâtre, à impressions peu distinctes; métathorax à lignes soulevées distinctes, avec un petit mucron aux angles postérieurs. Écusson grand, aplati, blanc, de même que le post-écusson. Ailes hyalines, quelque peu enfumées, nervures brunes, stigma brun avec une tache blanche à la base, aréole petite, pentagonale, écailles blanches avec une tache jaunâtre en avant. Pattes rousses, les postérieures avec l'extrémité des cuisses et des jambes, de même que les tarsi, noir. Abdomen étroit, à côtés presque parallèles, les segments 1, 2 et 3 roux, 4 et 5 noirs, et le reste blanc, le 1er segment long, élargi et courbé à son extrémité, le 2e avec une impression peu profonde de chaque côté.

Un seul spécimen ♂, bien distinct par la coloration de son abdomen.

La table pour la distinction des espèces peut maintenant se lire comme suit:

Thorax noir;

Abdomen noir;

Abdomen noir avec taches blanches;

Segments abdominaux marginés de blanc;

Un anneau blanc aux antennes.... 1. *jocosus*, Pr., VI, 300.

Point d'anneau aux antennes..... 5. *rufipes*, Pr., VII, 263.

Segments abdominaux tachés de

jaune au milieu..... 6. *pallipes*, Pr., VII, 264.

Abdomen entièrement noir;

Toutes les hanches rouges.... 7. *negricornis*, Pr., VII, 264.

Les 4 hanches antérieures blanches. 8. *sericeus*, Pr., VII, 264.

Abdomen plus ou moins roux;

Écusson jaune ou blanc;

Un anneau blanc aux antennes;

Hanches noires..... 2. *longicornis*, Pr., VI, 300.

Hanches rouges;

Abdomen non taché de blanc

à l'extrémité..... 9. *annulatus*, Pr., VII, 265.

Abdomen taché de blanc à

l'extrémité..... 14. *apicalis*, Pr., VII, 266.

Point d'anneau aux antennes... 10. *tarsatus*, Pr., VII, 265.

Écusson noir, sans tache;

Les 4 hanches antérieures

blanches..... 11. *albicoxus*, Pr., VII, 266.

Toutes les hanches rousses ;

Face blanche, scape noir en

dessous 3. *nitidus*, Pr., VI, 301.

Face noire, scape roux en

dessous..... 4. *rufotinctus*, Pr., VI, 301.

Thorax plus ou moins roux ;

Mésothorax noir. 12. *thoracicus*, Cress. VII, 266.

Mésothorax entièrement roux..... 13. *ruficoxus*, Pr., VII, 266.

Gen. NÉMATOPODE. *Nematopodius*, Gravenh.

Ce sont, d'après Gravenhort, des Mésostènes qui ont l'abdomen allongé, avec la tarière des femelles courte, les antennes grêles, et les ailes de grandeur médiocre, avec une aréole pentagonale, ou petite et carrée. Les pattes sont grêles, le métathorax est coupé obliquement en arrière, et les hanches postérieures semblent le continuer.

Nous rangeons dans ce genre des espèces de Mésostènes qui se distinguent par une aréole beaucoup plus grande ; cette aréole étant pentagonale ou presque carrée.

Nous n'en connaissons encore que deux espèces.

Abdomen roux, noir à l'extrémité..... 1. *Canaensis*.

Abdomen entièrement roux..... 2. *coxatus*.

1. Nématopode du Canada. *Nematopodius Canadensis*.

nov. sp.

♂—Long. .37 pouce. Noir ; les palpes, les écailles alaires avec les tarses postérieurs, blanc. Antennes longues, filiformes, brunes. Dos du mésothorax ponctué, a impressions distinctes ; métathorax déclive en arrière, fortement ponctué, les lignes soulevées bien distinctes quoique peu saillantes. Ailes hyalines, iridescentes, à nervures brunes, stigma brun avec une tache claire à la base, aréole très grande, presque carrée, la nervure inférieure étant légèrement anguleuse au milieu ; nervures cubito-discoïdale peu arquée et légèrement flexueuse. Pattes rousses, les postérieures très longues avec le sommet des cuisses et des jambes noir, et leurs tarses blancs avec la base et l'extrémité noires, toutes les hanches avec les trochantins, noir. Abdomen roux, noir à la base et à l'extrémité, de longueur moyenne, s'élargissant un peu à partir du 2e segment ; pédicule moyen, avec les tubercules stigmatifères en arrière du milieu, élargi au sommet.

Six spécimens ♂. Espèce bien distincte par sa coloration et surtout sa grande aréole carrée. Un spécimen a

les jambes postérieures presque entièrement noires, avec les orbites, le chaperon et une tache à l'extrémité de l'abdomen, blanc.

1. Nématopode grosses-hanches. *Nematopodius coxatus*. nov. sp.

♂—Long. .30 pouce. Noir, abdomen rouge; palpes blancs. Antennes longues, sétacées, noires, quelque peu grenus vers l'extrémité. Thorax fortement granulé, dos du mésothorax sans impressions distinctes; métathorax fortement déclive en arrière, avec les lignes soulevées bien distinctes. Pattes fort longues, noires, les 4 jambes antérieures blanchâtres, les cuisses postérieures avec un anneau roux à la base, hanches postérieures très renflées en dessous. Ailes légèrement lavées de jaune, nervures brunes, aréole grande, presque carrée. Abdomen étroit, linéaire, entièrement roux, à pédicule allongé, peu élargi en arrière.

Un seul spécimen ♂. Les hanches postérieures de cette espèce la font distinguer à première vue.

Gen. BARYCÈRE. *Baryceros*, Grav.

L'absence d'aréole aux ailes et des antennes plus grosses et comprimées au milieu distinguent particulièrement les Barycères des Mésostènes. La tarière des femelles est à peine plus longue que la moitié de l'abdomen.

Barycère rhopalocère. *Baryceros rhopalocerus*. nov. sp.

♂—Long. .23 pouce. Noir; la face, les palpes, le scape en dessous, les écailles alaires, les 4 hanches antérieures avec les trochantins, jaune pâle. Antennes presque aussi longues que le corps, à articles plus courts que longs, grossies en massue à partir du milieu et delà s'amincissant jusqu'à l'extrémité, d'un jaune roussâtre avec la partie en massue noire. Thorax d'un noir brillant, lobes du mésothorax bien distincts, métathorax à lignes soulevées distinctes. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma noir avec une tache blanche à la base, point d'aréole, et la nervure divisant les 2 cellules cubitales assez courte. Pattes d'un roux clair, les postérieures allongées avec l'extrémité des cuisses et des jambes blanche; tarsi pâles. Abdomen roux, noir à la base et à l'extrémité, en ovale allongé, le pédicule moyen, s'élargissant en arrière et portant deux petites carènes.

Un seul spécimen ♂. La forme des antennes ne permet pas de confondre cet insecte avec aucun des genres

voisins, ce grossissement en massue est tout-à-fait remarquable.

Gen. ICHNEUMON, VII, p. 20.

72. Ichneumon d'airain. *Ichneumon Bronteus*, Cress.
Ichneumon Bronteus, Cr. Proc. Ent. Soc. Phil. III, 144.

Un seul spécimen ♂.

73. Ichneumon de Clopin, *Ichneumon Clopini*. Prov. VII, 250.

Deux spécimen ♂.

Gen. ISCHNUS, VII, p. 109.

11. Ischne varié. *Ichnus variegatus*, Prov. VII, p. 250.

Gen. MESOLEPTUS, VII, p. 113.

10. Mésolepte majeur. *Mesoleptus major*, Cress.

Mesoleptus major, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 257 ♂.

Un seul spécimen ♂.

11. Mésolepte jambes-pâles. *Mesoleptus tibiator*, Cress.

Mesoleptus tibiator, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 259, ♂.

Quatre spécimens ♂.

12. Mésolepte incomplet. *Mesoleptus incompletus*. nov. sp.

♀—Long. .22 pouce. Noir; les orbites antérieurs, le chaperon, les mandibules, les palpes, les écailles alaires, jaune pâle. Antennes plus longues que le corps, grêles, filiformes, noires. Métathorax à lignes soulevées bien distinctes. Ailes hyalines, nervures brunes, stigma roussâtre, aréole manquant ou plutôt incomplète, sa nervure supérieure extérieure manquant. Pattes rousses, les 4 hanches antérieures tachées de noir à la base, les postérieures entièrement noires. Abdomen allongé, épaissi et comprimé légèrement à l'extrémité, le premier segment long et grêle, épaissi au sommet; tarière de la moitié de l'abdomen environ.

Trois spécimens, 1 ♀ et 2 ♂. Bien remarquable par son aréole incomplète.

13. Mésolepte agile. *Mesoleptus oxygus*, Cress.

Mesoleptus oxygus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 262, ♀.

Neuf spécimens ♂ et ♀.

14. **Mésolepte de St. Hyacinthe.** *Mesoleptus Sancti-Hyacinthi*. Prov. VII, 251.

Quatre spécimens ♂.

15. **Mésolepte allié.** *Mesoleptus affinis*, Cress.

Mesoleptus affinis, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 263, ♂.

Un spécimen ♂.

16. **Mésolepte pieds-longs.** *Mesoleptus longipes*. nov. sp.

♂—Long. .40 pouce. Noir; la face, les mandibules, les palpes, les orbites antérieurs, les joues au dessous des yeux, les écailles alaires avec une marque en crochet sur les bords latéraux du mésothorax et un anneau aux 4 tarses postérieurs, d'un jaune pâle. Antennes longues, sétacées, noires avec un anneau blanc au delà du milieu. Métathorax à lignes soulevées brin distinctes. Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, stigma noir avec une tache blanche à la base, aréole petite, pétiolée. Pattes fort longues, les postérieures surtout noires, les 4 jambes antérieures brunâtres, et les 4 tarses postérieurs avec un anneau blanc au milieu. Abdomen assez grêle, légèrement déprimé, noir, l'extrémité du 2e segment avec les 3e et 4e d'un roux obscur; le 1er segment long, grêle, s'élargissant insensiblement au sommet, avec les tubercules stigmatifères vers le milieu.

Un seul spécimen ♂, bien reconnaissable par les anneaux blancs des antennes et des tarses.

17. **Mésolepte remarquable.** *Mesoleptus eximius*, Cress.

Mesoleptus eximius, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 100, ♂.

Un spécimen ♂.

18. **Mésolepte brunâtre.** *Mesoleptus fucatus*, Cress.

Mesoleptus fucatus, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. II, p. 99, ♂.

Un spécimen ♂.

La clef pour la distinction des espèces peut maintenant se lire comme suit :

Ecusson noir ;

Abdomen noir ;

Une aréole aux ailes ;

Jambes postérieures blanches avec

2 anneaux noirs..... 1. *annulipes*, Cress., VII, 113.

Jambes postérieures noires ou rousses ;

Jambes postérieures rousses... 10. *major*, Cress. VII, 270

- James postérieures noires avec un large
anneau pâle. 11. *tibiator*, Cress. VII, 270.
- Point d'aréole aux ailes antérieures 12. *incompletus*, Pr. VII, 270.
- Abdomen roux ou roux et noir ;
- Une aréole aux ailes ;
- Scape noir en dessous ;
- Point d'anneau aux antennes. 13. *Oxylus*, Cress, VII, 270.
- Un anneau blanc aux antennes. 16. *longipes*, Pr. VII, 271.
- Scape jaune ou roux en dessous ;
- Abdomen roux au sommet ;
- Antennes jau-
nâtres. . 14. *Sancti-Hyacinthi*, Prov. VII, 271.
- Antennes noires..... 15. *affinis*, Cress. VII, 271.
- Abdomen noir au sommet.. 2. *flavirictus*, Cress. VII, 114.
- Point d'aréole aux ailes ;
- Face noire..... 3. *micans*, Prov. VII, 114.
- Face jaune..... 4. *depressus*, Prov. VII, 114.
- Ecusson blanc ou roux ;
- Abdomen roux et noir ,
- Tarses postérieurs blancs ;
- Antennes avec un anneau blanc 5. *honestus*, Cress. VII, 114.
- Antennes sans anneau blanc ;
- Une aréole aux ailes..... 17. *eximius*, Cress. VII, 271.
- Point d'aréole aux ailes..... 18. *fucatus*, Cress. VII, 271.
- Tarses postérieurs noirs..... 6. *maculosus*, Prov. VII, 114.
- Abdomen noir rayé de blanc ;
- Métathorax taché de jaune... 7. *pulcherrimus*, Cress. VII, 115.
- Métathorax sans tache ;
- Mésothorax avec taches jaunes
aux bords..... 8. *decens*, Cress. VII, 115.
- Mésothorax sans taches aux bords
antérieurs..... 9. *variabilis*, Prov. VII, 115.

Gen. POSOCENTRE. *Posocentrus*, nov. genus.

(De *posos*, de quelque étendue, et *kentron*, dard ; allusion à la tarière moyenne des femelles)

Tête assez grosse, en carré transversal vue en dessus ;
face passablement bombée.

Antennes filiformes, légèrement noueuses, à articles
plus longs que larges, un peu plus longues que le corps ;

leur premier article assez court, échancré à l'extrémité de haut en bas et en dehors.

Ailes antérieures avec une aréole pentagonale dont le plus petit côté est en dessus, la nervure moyenne passablement arquée.

Pattes grêles, les postérieures longues; tarses fort longs, à crochets simples; pelote assez petite.

Abdomen allongé, rétréci à ses deux extrémités, à pédicule court, s'élargissant insensiblement vers le sommet, le 2e segment plus long que le premier et continuant son élargissement, gonflé en dessous et portant à sa base en dessus une impression transversale comme dans les ichneumonides, mais non interrompue au milieu, les segments terminaux se rétrécissant insensiblement, et le dernier fendu pour recevoir la tarière qui est un peu plus courte que lui.

Ce genre se distingue des *Mésopleptes* et des *Tryphons* par la forme de l'aréole de ses ailes qui est pentagonale, et des *Mésostènes* par son abdomen qui est à peine pédiculé et qui porte une impression transversale sur son 2e segment. Son extrémité fendue pour couvrir la tarière est aussi un caractère qui l'éloigne des uns et des autres, et sa face gonflée l'exclut également du groupe des *Pemplides*.

Posocentre de Huard. *Posocentrus Huardi*. nov. sp.

♀—Long. .26 pouce. D'un noir brillant; les mandibules, les écailles alaires avec une petite ligne en dessous et une ancre en avant sur les bords latéraux du prothorax, et tous les trochantins, blanc. Face finement ponctuée, renflée pour l'insertion des antennes avec une impression profonde de chaque côté au dessus du chaperon. Antennes longues, filiformes, noires à la base, brunes à l'extrémité. Thorax assez allongé, mésothorax avec impressions distinctes; métathorax, légèrement oblique en arrière, avec lignes soulevées très apparentes, le partageant en aires distinctes. Ailes hyalines, nervures brunes, blanches à la base, stigma roussâtre, aréole pentagonale. Pattes assez longues, grêles, d'un beau roux clair, les 4 jambes antérieures blanches en avant, les postérieures obscurcies aux extrémités et blanchâtres au milieu, leurs tarses brunâtres. Abdomen allongé, aussi large que le thorax, rétréci à ses deux extrémités, brièvement pédiculé, le premier segment épais à l'extrémité et s'élargissant insensiblement presque à partir de la base, finement aciculé au sommet, 2e segment plus long

que le premier, avec une impression transversale près de la base, segment terminal fendu et allongé pour recouvrir en partie la tarière qui le dépasse environ des deux tiers de sa longueur.

Quatre spécimens ♀, nous ne connaissons pas le ♂. Ces insectes présentent un facies particulier qui les fait reconnaître à première vue. Nous dédions avec plaisir ce bel insecte au Rév. M. Huard, ecclésiastique du Séminaire de Québec, qui se dévoue avec un zèle sans égal à l'étude des productions naturelles de notre pays.

(A continuer).

LES ZOOPHYTES INFUSOIRES DU CANADA.

Par le Dr. J. A. CREVIER.

1er Genre. AMIBE. *Amiba*, Ehrenb.

1. Amibe Majeure. *Amiba princeps*, Ehrenb. Fig. 24.




FIG. 24.

Large de 0.37 à 0.60, blanc jaunâtre. Remplie de granules qui réfractent fortement la lumière, et se portent ou refluent dans des expansions successivement formées, lesquelles sont diaphanes à l'extrémité et souvent très-longues.

Cette espèce se rencontre dans les fossés et les flaques d'eau croupissantes, en automne et